



即時發布

2022年02月22日

## 香港醫學專科學院與轄下 15 個分科學院 因應目前 2019 冠狀病毒病疫情的發展之聯合聲明

具極高傳播力的Omicron變種病毒株肆虐全球，並誘發了本港第五波疫情大爆發。雖然Omicron變種病毒株看似導致嚴重疾病或死亡率的風險較先前的變種病毒株為低，但其高傳播力足以導致社區感染個案大增，已對本港醫療系統造成重大的負擔。

本聲明概述了香港醫學專科學院和其不同專科的分科學院就目前 2019 冠狀病毒病的疫情發展所持的觀點及作出呼籲。

### 2019 冠狀病毒病檢測結果呈陽性或出現病徵的市民

市民請留意下列要點:

1. 急症室服務在醫療系統中擔當著獨特而重要的角色，並於醫療系統起著關鍵作用。除了處理 2019 冠狀病毒病的患者外，急症室必須確保其他緊急的傷患者能夠得到及時的專業評估和治療。
2. 不適當使用急症室服務有可能危及緊急傷患者所需的照顧，令真正需要急症室服務的人士之輪候時間延長。
3. 初步確診或已確診陽性的市民，請依從當局就前往急症室或專為等 2019 冠狀病毒病患者而設的指定診所之相關指引作出安排。

### 盡早接種疫苗

強烈建議市民盡早接種新冠疫苗。接種新冠疫苗對預防重症及死亡非常有效。符合接種第三劑的市民應盡早接種，以加強疫苗的保護效能。

兒童是這一波疫情中受影響最嚴重的群組之一。適齡兒童應該盡快接種疫苗。而成年人接種疫苗，亦能間接保護尚未可接種疫苗的幼童和嬰兒。



長者是另一個容易受到病毒感染而引發嚴重疾病或死亡的高危群組。因此，長者不應再遲豫，盡早接種新冠疫苗。

同時，強烈建議孕婦和哺乳期婦女接種疫苗，以更好地保護自己和嬰兒。

### **保持警惕，維持感染控制措施**

不論已接種疫苗與否，以下措施是減低病毒於社區傳播的關鍵：

- 保持社交距離
- 減少社交及避免跨家庭聚會
- 減少外出或前往人多的地方
- 盡量讓員工在家工作
- 佩戴合適的口罩，並保持良好的手部衛生
- 脫下口罩進餐時盡量避免說話，完成用餐後馬上戴上口罩
- 避免握手或身體接觸

市民若出現 2019 冠狀病毒病的病徵，應立即求醫，並接受 2019 冠狀病毒檢測。

2019 冠狀病毒病正威脅全球。我們呼籲市民繼續履行社會責任，採取預防措施，保持警覺，繼續積極對抗疫情。我們呼籲公眾，尤其是尚未接種疫苗的長者，應立即採取行動，接種第一劑新冠疫苗，並依時接種第二劑疫苗和加強劑。

**護己護人，同心抗疫！**